


子宮頸癌



婦女須知

我應該注意什麼？

子宮頸癌往往沒有早期的症狀或跡象。所以，婦女定期進行柏氏塗片檢查是很重要的。癌症常常是在擴散到身體其他部位之後才有症狀。下面的症狀一旦出現，請立即通知您的醫生：

- 陰道流出非正常分泌物；
- 非經期陰道少量流血或血印；
- 性交時出血或疼痛。

這些不一定表示您患有癌症。它們也許是別的因素引起的。爲了確定不是癌症，必經醫生檢查。

哪些因素會增加子宮頸癌的危險？

這些因素會增加您患上子宮頸癌的危險包括：

- 年齡較小時性交；
- 有多名性伴侶；
- 與有過多名性伴侶的人性交；
- 感染導致生殖器疣的病毒（人類乳頭瘤病毒，簡稱 HPV）。並非所有感染過人類乳頭瘤病毒或生殖器疣的婦女都會引發子宮頸癌；
- 抽煙；
- 感染人類免疫缺陷（人類免疫缺陷導致艾滋病的發生）；
- 感染生殖器疱疹感染或皮衣菌（二者是性傳染疾病）

- 長期服用避孕藥；
- 蔬菜、水果吃得不夠；
- 體重過重；
- 母親或者姊妹中有人患過子宮頸癌；
- 不定期進行柏氏塗片檢查。

爲了早期發現子宮頸癌，我可以做什麼？

- 婦女應當從 18 歲起或開始有性行爲後，每年接受骨盆檢查。
- 有性行爲的婦女應當在第一次性交三年以後或者在滿 21 歲的時候進行第一次年度柏氏塗片檢查。您 30 歲以上而且具備特定條件，醫生會讓您不必每年作柏氏檢查。
- 柏氏檢查可以發現早期癌症的跡象。治療這些疾病可以防止子宮頸癌。
- 作骨盆檢查的時候，醫生觸診女性器官，檢測其大小與形狀。骨盆檢查有助於發現女性器官的疾病，但它無助於早期診斷出子宮頸癌。爲此，必須進行柏氏塗片檢查。

接背葉



