

ការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើត

កូនរបស់អ្នកបានប្រឡងជាប់ការពិនិត្យស្តាប់ឮលើកដំបូង!

លទ្ធផលនៃការពិនិត្យការស្តាប់ឮបង្ហាញថា ទារករបស់អ្នកអាចស្តាប់ឮទាំងពីរត្រចៀកនៅពេលនេះ។

ឈ្មោះទារក៖ _____

កាលបរិច្ឆេទ៖ _____ វិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ចាំង (គួរដាក់មួយ)៖
OAE ABR

តើយើងបានពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់កូនអ្នកដោយរបៀបណា?

ការពិនិត្យបានចំណាយពេលតែពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះ

ដែលភាគច្រើនទំនងជានៅពេលកូនរបស់អ្នកគេង។

សំឡេងស្រទន់ត្រូវបានចាក់តាមរយៈកាសស្តាប់ត្រចៀកដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់ទារក។

ការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកចំពោះសំឡេងត្រូវបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Otoacoustic Emissions (OAE) ឬ Auditory Brainstem Response (ABR) ។

វិធីសាស្ត្រពិនិត្យដោយស្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទុកចិត្តបានខ្លាំងណាស់។

កម្រនឹងខកខានទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ។

ការពិនិត្យបង្ហាញថាទារករបស់អ្នកកំពុងស្តាប់ឮនៅពេលនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ទារកមួយចំនួនតូចដែលឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើតអាចវិវត្តទៅជាការបាត់បង់ការស្តាប់នៅពេលក្រោយក្នុងជីវិត។

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្តទារក?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮអាចមើលមិនឃើញ។

ឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យអាចរកឃើញការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារក។

ខែ និងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។

ទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ឬថ្លង់អាចមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញភាសាធម្មតា

ឬអាចធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងសាលារៀន។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុង

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការបាត់បង់ទាន់ពេល និងផ្តល់សេវាកម្មពិសេសដល់

ទារក និងគ្រួសារ។

តើទារកប៉ុន្មាននាក់មានការបាត់បង់ការស្តាប់?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទារកប្រហែល 2-4 នាក់ក្នុងចំណោម 1000 នាក់។ ប្រហែល 50% នៃទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮមិនមានសញ្ញា ឬកត្តាហានិភ័យ ដូចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬប្រវត្តិគ្រួសារនៃការច្រង់ជាដើម។

ទារកខ្លះអាចបាត់បង់ការស្តាប់នៅពេលក្រោយក្នុងជីវិតដោយសារការឆ្លងមេរោគត្រចៀកម្តង ហើយម្តងទៀត រលាកស្រោមខួរ រលាកក្បាល ឬលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។

ពេលខ្លះទារកបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ហើយមូលហេតុមិនត្រូវបានគេដឹងឡើយ។

ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យទារករបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ណាមួយ។ ហេតុផលទី មួយក្នុងការសាកល្បងសវនាការរបស់កុមារដោយមិនគិតពីលទ្ធផលតេស្តមុនណាមួយគឺការព្រួយ បារម្ភពីអ្នកថែទាំ។ អ្នកស្គាល់កូនរបស់អ្នកល្អបំផុត។

តើមានអ្វីបន្ទាប់សម្រាប់ទារក?

ការស្តាប់ឮគួរតែត្រូវបានពិនិត្យនៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកធំឡើង។

ការពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត គឺជាជំហានដំបូងក្នុងការមើលការស្តាប់ឮ ការនិយាយ និងការរីកចម្រើននៃភាសារបស់ទារកអ្នក។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបដែលភាសា

និងការនិយាយរបស់ទារកអ្នកអភិវឌ្ឍ។

ព័ត៌មាន “ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ និងការនិយាយតាមអាយុ”

នៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនេះរាយបញ្ជីរឿងមួយចំនួនដែលទារកភាគច្រើននឹងធ្វើនៅអាយុផ្សេងៗគ្នា។

នៅពេលកូនរបស់អ្នកធំឡើង អ្នកអាចប្រៀបធៀបសកម្មភាព

និងការនិយាយរបស់ពួកគេទៅនឹងបញ្ជី។

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការស្តាប់ឮរបស់ទារកអ្នក

សូមទាក់ទងគ្រូពេទ្យទារករបស់អ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពភ្លាមៗ។

ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយតាមអាយុ

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ និងការនិយាយ
កំណើតដល់ 3 ខែ	» ស្ទាត់ស្ងៀមចំពោះសំឡេង ឬសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់ » មានប្រតិកម្មទៅនឹងសំឡេងខ្លាំង ទារកភ្ញាក់ព្រិចភ្នែក ឈប់ដេញាក់ យំ ឬភ្ញាក់ឡើង។ » បង្កើតសំឡេងស្រទន់ពេលភ្ញាក់ពីគេង ទារកត្រវីក្បាល

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ និងការនិយាយ
3 ទៅ 6 ខែ	» បង្វែរភ្នែក ឬឆ្ពោះទៅរកសំឡេង សំលេង សំលេងរំខាន ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង ឆ្អែត្រស » ចាប់ផ្តើមបង្កើតការនិយាយដូចជាសំឡេង "ហ្កា" "អូហ្កា" "បា" និងសំឡេង p, b, m » ប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្លេងរបស់អ្នក។
6 ទៅ 9 ខែ	» ឆ្លើយតបទៅនឹងឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន និងរូបរាងនៅពេលហៅ » យល់ពាក្យសំដីសាមញ្ញ "ទេ" "លាហើយ" "ទឹកផ្លែឈើ" » សម្លេងចេចចាច, "da da da," "ma ma ma," "ba ba ba"
9 ទៅ 12 ខែ	» ឆ្លើយតបទាំងសំឡេងទន់ ឬខ្លាំង » ធ្វើពាក្យដដែលៗ និងធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងសត្វ » ចង្អុលទៅរបស់ក្មេងលេង ឬអាហារដែលចូលចិត្តនៅពេលសួរ
12 ទៅ 18 ខែ	» ប្រើពាក្យ 10 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ធ្វើតាមបង្គាប់ជាពាក្យសាមញ្ញ "យកបាល់" » ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែករាងកាយ ឬប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេង នៅពេលសួរ » លោតទៅតន្ត្រី
18 ទៅ 24 ខែ	» ប្រើពាក្យ 20 ឬច្រើនជាងនេះ។ » ផ្សំពាក្យ 2 ឬច្រើន "ទឹកច្រើន" "នោះជាអ្វី?" » ប្រើសំឡេងព្យញ្ជនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅដើមពាក្យ b, g, m » ស្តាប់រឿង និងចម្រៀងសាមញ្ញៗ
2 ទៅ 3 ឆ្នាំ។	» ប្រើប្រយោគ 2-3 ពាក្យ » នៅអាយុ 2 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយខ្លះៗ (25%-50%) » នៅអាយុ 3 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយភាគច្រើនបំផុត (50%-75%) » ធ្វើតាមការណែនាំពីរជំហាន "យកបាល់ហើយដាក់វានៅលើតុ"

ការស្តាប់ឮអាចត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅគ្រប់អាយុ។

គោលដៅនៃកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ទារកទើបនឹងកើតរបស់រដ្ឋ California (NHSP) គឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅអាយុប្រាំមួយខែ។ NHSP មានមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ ដែលធ្វើការជាមួយគ្រួសារ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាមានទទួលបានសេវាដែលត្រូវការ។

NHSP ប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យការស្តាប់របស់កូនអ្នកតាមផ្នែកទី 124119 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយអ្នក និងកូនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។ វាអាចទៅរួចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចទាក់ទងអ្នកអំពីសេវាកម្មតាមដាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

- » ហៅទូរសព្ទទៅលេខគតគិតថ្លៃ 1-877-388-5301 ឬចូលមើលគេហទំព័រ www.dhcs.ca.gov/services/nhsp

