

# កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត

នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋ California (DHCS) សេវាវេជ្ជសាស្ត្រកុមារ (CMS) បានអនុវត្តកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត (NHSP) ទូទាំងរដ្ឋ ដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណការបាត់បង់ការស្តាប់ឮចំពោះទារក។ NHSP ជួយណែនាំគ្រួសារទៅរកសេវាសមស្របដែលត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។

គ្រួសាររបស់ទារកដែលសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ DHCS ដើម្បីចូលរួមក្នុង NHSP នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឱ្យពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារករបស់ពួកគេ។ ទារកដែលមិនឆ្លងកាត់ការពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តបន្ថែមបន្ទាប់ពីរំលាយចេញ។

DHCS កំពុងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់ការស្តាប់ឮ ដើម្បីធ្វើការជាមួយមន្ទីរពេទ្យក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮ អនុវត្តសកម្មភាពធានាគុណភាព និងតាមដានទារកដែលត្រូវការសេវាបន្ថែម។

## តើយើងពិនិត្យការស្តាប់ឮដោយរបៀបណា?

ការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារកទើបនឹងកើតធ្វើឡើងមុនពេលម្តាយ និងទារកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។ ការពិនិត្យត្រូវចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ ខណៈកូនរបស់អ្នកគេង។

សំឡេងស្រទន់ត្រូវបានចាក់តាមរយៈកាសស្តាប់ត្រចៀកដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់ទារក។ ការឆ្លើយតបរបស់កូនអ្នកចំពោះសម្លេងនឹងត្រូវបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ Otoacoustic Emissions (OAE) ឬ Auditory Brainstem Response (ABR) ។

វិធីសាស្ត្រពិនិត្យងាយស្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចទុកចិត្តបានខ្លាំងណាស់។ កម្រណាស់ដែលទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮនឹងត្រូវខកខាន។

## តើនរណាជាអ្នកបង់ថ្លៃសម្រាប់ការពិនិត្យការស្តាប់ឮ?

ការធានារ៉ាប់រងជាទូទៅគ្របដណ្តប់លើការចំណាយលើការពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើត។ Medi-Cal នឹងចំណាយសម្រាប់ការពិនិត្យរកទារកដែលមានសិទ្ធិ។

## តើទារកប៉ុន្មាននាក់មានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទារកប្រហែល 2-4 នាក់ក្នុងចំណោមទារក 1,000 ។ ប្រហែល 50% នៃទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮមិនមានសញ្ញា ឬកត្តាហានិភ័យ ដូចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬប្រវត្តិគ្រួសារនៃការផ្លូវជាដើម។ ទារកខ្លះមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅពេលក្រោយក្នុងជីវិតដោយសារការឆ្លងមេរោគត្រចៀក



ម្តងហើយម្តងទៀត រលាកស្រាមខ្នុរ របួសក្បាល ឬលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។  
 ពេលខ្លះទារកបាត់បង់ការស្តាប់ឮ ហើយមូលហេតុមិនត្រូវបានគេដឹងឡើយ។

## ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើតេស្តទារក?

ការបាត់បង់ការស្តាប់ឮអាចមើលមិនឃើញ។

ឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឱ្យអាចរកឃើញការបាត់បង់ការស្តាប់ឮនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារក។

ខែ និងឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់កុមារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនង។ ទារកដែលបាត់បង់ការស្តាប់ឮ

ឬផ្លូវអាចមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញភាសាធម្មតា

ឬអាចធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងសាលារៀន។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនូវការបាត់បង់មុនពេលវេលា និងផ្តល់សេវាកម្មពិសេសដល់ទារក និងគ្រួសារ។

បណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិក

និងអង្គការវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យពិនិត្យការស្តាប់ឮសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើតទាំងអស់

និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៃការស្តាប់របស់កុមារពេញមួយឆ្នាំដំបូង។

## ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយតាមអាយុ

អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
កំណើតដល់ 3 ខែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ស្ទាត់ទៅសំឡេង ឬសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់</li> <li>» ប្រតិកម្មទៅនឹងសំឡេងខ្លាំង ទារកភ្ញាក់ ព្រិចភ្នែក ឈប់ដេក យំ ឬភ្ញាក់ឡើង។</li> <li>» បង្កើតសំឡេងស្រទន់ពេលភ្ញាក់ពីគេង ទារកគ្រវីក្បាល</li> </ul>
3 ទៅ 6 ខែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» បង្វែរភ្នែក ឬឆ្ពោះទៅរកសំឡេង ពាក្យសំដីសម្រែករបស់ប្រដាប់ប្រដាភ្លេងលេង ឆ្លែព្រុស</li> <li>» ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញសំឡេងដូចជាសំឡេង "ហ្កា" "អូ" "បា" និងសំឡេង p, b, m</li> <li>» ប្រតិកម្មទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្លេងរបស់អ្នក។</li> </ul>



អាយុ	ដំណាក់កាលនៃការស្តាប់ឮ និងការនិយាយ
6 ទៅ 9 ខែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ឆ្លើយតបទៅនឹងឈ្មោះរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងរូបរាងនៅពេលហៅ</li> <li>» យល់ពាក្យសំដីសាមញ្ញ "ទេ" "លាហើយ" "ទឹកផ្លែឈើ"</li> <li>» សម្លេងចេចចាច, "da da da," "ma ma ma," "ba ba ba"</li> </ul>
9 ទៅ 12 ខែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ឆ្លើយតបទាំងសំឡេងទន់ ឬខ្លាំង</li> <li>» ធ្វើពាក្យដដែលៗ និងធ្វើគ្រាប់តាមសំឡេងសត្វ</li> <li>» ចង្អុលទៅរបស់ក្មេងលេង ឬអាហារដែលចូលចិត្តនៅពេលសួរ</li> </ul>
12 ទៅ 18 ខែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ប្រើពាក្យ 10 ឬច្រើនជាងនេះ។</li> <li>» ធ្វើតាមការណែនាំជាពាក្យសំដីសមញ្ញ "យកបាល់"</li> <li>» ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែករាងកាយ ឬប្រដាប់ប្រដា ក្មេងលេង នៅពេលសួរ</li> <li>» លោតហក់តាមភ្លេងតន្ត្រី</li> </ul>
18 ទៅ 24 ខែ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ប្រើពាក្យ 20 ឬច្រើនជាងនេះ។</li> <li>» ផ្សំពាក្យ 2 ឬច្រើន "ទឹកច្រើន" "នោះជាអ្វី?"</li> <li>» ប្រើសំឡេងព្យញ្ជនៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅដើមពាក្យ b, g, m</li> <li>» ស្តាប់រឿង និងចម្រៀងសាមញ្ញៗ</li> </ul>
2 ទៅ 3 ឆ្នាំ	<ul style="list-style-type: none"> <li>» ប្រើប្រយោគ 2-3 ពាក្យ</li> <li>» នៅអាយុ 2 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយខ្លះៗ (25%-50%)</li> <li>» នៅអាយុ 3 ឆ្នាំ មនុស្សអាចយល់ពីអ្វីដែលកុមារនិយាយភាគច្រើនបំផុត (50%-75%)</li> <li>» ធ្វើតាមពាក្យសំដីណែនាំពីរជំហាន "យកបាល់ហើយដាក់វានៅលើតុ"</li> </ul>

**ការស្តាប់ឮអាចត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅគ្រប់អាយុ។**

គោលដៅនៃកម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ឮទារកទើបនឹងកើតរបស់រដ្ឋ California គឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទារកដែលមានការបាត់បង់ការស្តាប់ឮ



ហើយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅអាយុប្រាំមួយខែ។  
កម្មវិធីនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮ ដែលធ្វើការជាមួយគ្រួសារ  
អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យ  
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាកុមារទទួលបានសេវាដែលត្រូវការ។

កម្មវិធីពិនិត្យការស្តាប់ទារកទើបនឹងកើតប្រមូលព័ត៌មានអំពីការពិនិត្យការស្តាប់ឮរបស់ទារក  
របស់អ្នកតាមផ្នែកទី 124119 នៃក្រមសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។  
មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយអ្នក  
និងកូនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានសេវាដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ។  
វាអាចទៅរួចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់សំរួលការស្តាប់ឮអាចទាក់ទងអ្នកអំពីសេវាកម្មតាមដាន។

**សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖**

- » ហៅទូរសព្ទទៅលេខឥតគិតថ្លៃ 1-877-388-5301 ឬចូលមើលគេហទំព័រ  
[www.dhcs.ca.gov/services/nhsp](http://www.dhcs.ca.gov/services/nhsp)

