

# การส่งต่อการตรวจคัดกรองการได้ยิน

## ทำไมลูกน้อยของฉันจึงต้องได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินอีกครั้ง

ทารกจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำ ลูกน้อยของท่านไม่จำเป็นต้องสูญเสียการได้ยิน แต่สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปตามนัดหมายการติดตามอาการตามกำหนดทุกครั้ง

ไม่สามารถมีการคัดกรองครั้งแรกที่ดีเสมอไป มีปัจจัยหลายประการที่อาจรบกวนการตรวจคัดกรองการได้ยิน เช่น เสียงดังในห้อง ทารกที่ไม่อยู่นิ่ง หรือของเหลวหรือเศษต่าง ๆ ในหูหลังการคลอด

ทารกทุกรายที่เคยเข้ารับการรักษานในหน่วยการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และทารกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจคัดกรองโดยใช้ ABR มาก่อน จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง/ตรวจคัดกรองซ้ำโดยใช้ ABR

ควรตรวจคัดกรองทารกอีกครั้งเมื่อมีอายุตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน  
โรงพยาบาลจะนัดตรวจคัดกรองซ้ำให้กับท่าน ในช่วงเวลานี้ ศูนย์ประสานงานการได้ยิน (HCC) ของโครงการตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิดของรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านและลูกน้อยของท่านเพื่อให้ได้รับบริการที่จำเป็น

## การนัดหมายการตรวจคัดกรองซ้ำของลูกน้อยของท่าน

ชื่อทารก: \_\_\_\_\_  
วันที่นัดหมาย: \_\_\_\_\_ เวลา: \_\_\_\_\_  
สถานที่ตั้ง: \_\_\_\_\_  
เบอร์ติดต่อ: \_\_\_\_\_

กรุณาโทรมาหากท่านต้องการยกเลิก/กำหนดเวลานัดหมายของท่านใหม่

## การไปตามนัดหมายการตรวจคัดกรองซ้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ

การตรวจคัดกรองซ้ำเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสังเกตพัฒนาการด้านการได้ยิน การพูด และภาษาของลูกน้อยของท่าน การสูญเสียการได้ยินอาจมองไม่เห็น ในปัจจุบัน เทคโนโลยีทำให้สามารถตรวจการสูญเสียการได้ยินในช่วงแรกของชีวิตทารกได้

ช่วงเดือนและปีแรกของชีวิตเด็กเป็นช่วงที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทารกที่สูญเสียการได้ยินหรือหูหนวกอาจมีปัญหาในการพัฒนาทักษะทางภาษาปกติหรืออาจเรียนหนังสือได้ไม่ดี ดังนั้นการตรวจพบความสูญเสียแต่เนิ่น ๆ และการให้บริการพิเศษแก่ทารกและครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

## การได้ยินของลูกน้อยของฉันจะได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำได้อย่างไร

การตรวจคัดกรองซ้ำจะคล้ายกับการตรวจคัดกรองครั้งแรกที่ลูกน้อยของท่านได้รับในโรงพยาบาล การตรวจคัดกรองจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ส่วนใหญ่ในขณะที่ลูกน้อยของท่านนอนหลับ เสียงเบา ๆ จะถูกเปิดผ่านหูฟังที่ผลิตมาสำหรับทารกโดยเฉพาะ การตอบสนองของทารกต่อเสียงจะถูกวัดโดยอัตโนมัติด้วยการปล่อยเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (OAE) หรือการตรวจการได้ยินของเส้นประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR)

## สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำของทารก

จะเป็นประโยชน์หากลูกน้อยของท่านนอนหลับระหว่างการทดสอบ คำแนะนำบางประการเพื่อช่วยเตรียมลูกน้อยของท่านสำหรับการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ ได้แก่:

- » พยายามอย่าให้ลูกน้อยของท่านนอนหลับก่อนการนัดหมาย
- » การให้นมลูกน้อยของท่านก่อนการทดสอบอาจช่วยให้ลูกน้อยของท่านนอนหลับได้
- » นำผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำรอง เสื้อผ้าเปลี่ยน และนมผงสำรองมาด้วย (ถ้ามี)

## ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ

โดยทั่วไปประกันภัยจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด Medi-Cal จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองทารกที่เข้าเกณฑ์

## อะไรจะเกิดขึ้นหลังการตรวจคัดกรองซ้ำ

ท่านและแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของลูกน้อยของท่านจะได้รับผลการตรวจคัดกรองการได้ยินซ้ำ เป็นไปได้ที่ลูกน้อยของท่านจะผ่านการตรวจคัดกรองซ้ำ ทารกบางคนจะต้องได้รับการประเมินการได้ยินแบบเต็มรูปแบบมากกว่านี้ หากในเวลาทำการตรวจคัดกรองซ้ำพบว่าลูกน้อยของท่านจำเป็นต้องได้รับการประเมินการได้ยินเพื่อวินิจฉัย ผู้ที่ทำการตรวจคัดกรองซ้ำอาจกำหนดเวลาการประเมินให้กับท่านหรือส่งท่านไปพบกับผู้ให้บริการรายอื่น การเอาใจใส่ในพัฒนาการทางภาษาและการพูดของลูกของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูล "ขั้นตอนการได้ยินและการพูดตามอายุ" ในโบรชัวร์นี้ระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ทารกส่วนใหญ่มักจะทำได้ในแต่ละช่วงวัย

## ขั้นตอนการได้ยินและการพูดตามอายุ

| อายุ               | ขั้นตอนการได้ยินและการพูด                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แรกเกิดถึง 3 เดือน | <ul style="list-style-type: none"> <li>» ไม่ส่งเสียงตอบสนองต่อเสียงพูดหรือเสียงที่คุ้นเคย</li> <li>» ตอบสนองต่อเสียงดัง ทารกสะดุ้ง กระพริบตา หยุดดูดนม ร้องไห้ หรือตื่นขึ้น</li> <li>» เมื่อตื่นจะส่งเสียงเบา ๆ ทารกจะส่งเสียงในลำคอ</li> </ul>                                                                   |
| 3 ถึง 6 เดือน      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» มองตามหรือหันศีรษะตามเสียง เสียงพูด ของเล่นที่มีเสียงเสียงสนับห่า</li> <li>» เริ่มพูดออกเสียง เช่น "กา" "อุ" "บา" และเสียง พ, บ, เอ็ม</li> <li>» ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของท่าน</li> </ul>                                                                    |
| 6 ถึง 9 เดือน      | <ul style="list-style-type: none"> <li>» ตอบสนองต่อชื่อตัวเองและมองเมื่อเรียก</li> <li>» เข้าใจคำง่าย ๆ เช่น "ไม่" "บายบาย" "น้ำผลไม้"</li> <li>» พูดอ้อแอ้ เช่น "ดา ดา ดา" "มา มา มา" "บา บา บา"</li> </ul>                                                                                                      |
| 9 ถึง 12 เดือน     | <ul style="list-style-type: none"> <li>» ตอบสนองต่อเสียงทั้งเสียงเบาและเสียงดัง</li> <li>» พูดตามคำพูดคำเดียวและเลียนแบบเสียงสัตว์</li> <li>» ชี้ไปที่ของเล่นหรืออาหารที่ชอบเมื่อถูกถาม</li> </ul>                                                                                                                |
| 12 ถึง 18 เดือน    | <ul style="list-style-type: none"> <li>» ใช้คำตั้งแต่ 10 คำขึ้นไป</li> <li>» ปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นคำพูดง่าย ๆ เช่น "รับลูกบอล"</li> <li>» ชี้ไปที่คน ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือของเล่นเมื่อถูกถาม</li> <li>» โยกตัวตามเสียงเพลง</li> </ul>                                                                      |
| 18 ถึง 24 เดือน    | <ul style="list-style-type: none"> <li>» ใช้คำตั้งแต่ 20 คำขึ้นไป</li> <li>» รวมคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เช่น "น้ำผลไม้เพิ่ม" "นั่นอะไร"</li> <li>» ใช้เสียงพยัญชนะหลายเสียงที่ขึ้นต้นคำ เช่น คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ, จี, เอ็ม</li> <li>» ฟังเรื่องง่าย ๆ และเพลง</li> </ul>                                       |
| 2 ถึง 3 ปี         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» ใช้ประโยคที่ประกอบด้วยคำ 2-3 คำ</li> <li>» เมื่ออายุ 2 ขวบ สามารถเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดได้บางครั้ง (25%-50%)</li> <li>» เมื่ออายุ 3 ขวบ สามารถเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดได้เป็นส่วนใหญ่ (50%-75%)</li> <li>» ปฏิบัติตามคำสั่งสองขั้นตอน เช่น "รับลูกบอลแล้ววางบนโต๊ะ"</li> </ul> |

หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการไต่ถามของลูกน้อยของท่าน  
โปรดติดต่อแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของลูกน้อยของท่าน

เป้าหมายของโครงการตรวจคัดกรองการไต่ถามของทารกแรกเกิดของรัฐแคลิฟอร์เนียคือการระบุทารกที่สูญเสียการไต่ถามและเชื่อมโยงทารกเหล่านั้นไปยังบริการต่าง ๆ ภายในอายุหกเดือน  
โครงการนี้มีศูนย์ประสานงานการไต่ถามที่ทำงานร่วมกับครอบครัว ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และโรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ จะได้รับบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น

โครงการตรวจคัดกรองการไต่ถามของทารกแรกเกิดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองการไต่ถามของลูกน้อยของท่านตามมาตรา 124119 ของประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัย  
ศูนย์ประสานงานการไต่ถามอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเหลือท่านและลูกน้อยของท่านในการได้รับบริการต่าง ๆ ที่อาจจำเป็น ศูนย์ประสานงานการไต่ถามอาจติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการติดตามผล

**หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:**

- » หมายเลขโทรฟรี 1-877-388-5301
- » หรือเยี่ยมชมเราทางเว็บไซต์ที่ [www.dhcs.ca.gov/services/nhsp](http://www.dhcs.ca.gov/services/nhsp)